

## 青海醫院

### 藥癮替代療法 丁基原啡因/那囉克松 舌下錠

#### 甚麼是 丁基原啡因/那囉克松 舌下錠

主要成分是丁基原啡因，本身是嗎啡類的藥物，作用時間是嗎啡的 25-40 倍時間，另一成份為那囉克松，主要為了防止以注射使用濫用藥物

#### 使用 丁基原啡因/那囉克松 舌下錠 的好處

- \*可抑制鴉片類藥物的戒斷症狀
- \*減少對鴉片類藥物的渴望
- \*減少對鴉片類藥物的使用
- \*抑制其他鴉片類藥物的作用
- \*可攜帶回家、不需要天天到醫院吃藥

#### 服用方式

- \*必須經由舌下靜脈血管吸收進入血液循環中
- \*請勿嚼碎或吞服，會無法發生藥效
- \*原本有使用海洛因的人，至少須在海洛因最後一次使用後六個小時再來服用
- \*若是服用美沙酮的人想轉換，必須至少等 24-48 小時候才能服用
- \*一般建議，戒斷症狀開始再使用這類藥物來控制，比較不會產生不適

#### 什麼人適合使用 丁基原啡因/那囉克松 舌下錠

- \*鴉片類藥物成癮者
- \*年齡大於 16 歲
- \*在無監督的情況下能規則服藥者

#### 注意事項

- \*所有嗎啡類藥物一樣，過量都可能導致嗜睡、嘔吐及呼吸抑制等等
- \*跟鎮靜劑、安眠藥甚至酒精等中樞神經抑制劑一起服用，容易導致危險，尤其是酒精更容易產生更大的致命性風險