

思覺失調症

修訂日期：110 年 4 月

一、 什麼是思覺失調症

它是思考、知覺、行動、情感等多方面的障礙，與現實有明顯的脫節，嚴重影響其日常生活。

二、 思覺失調症的特徵

思覺失調症患者常常較自我封閉，思考方式為自閉性(與外界脫節)，且在連貫上較鬆散，有時也會出現思想、情緒不一致的現象。

三、 病因

1. 體質遺傳因素。
2. 心理人格因素。
3. 環境社會因素。

四、 治療

1. 藥物治療：是最有效、安全，也是不可或缺的治療方式。
2. 電氣療法：在藥效不佳或情況緊急時使用。
3. 心理治療：於病況穩定後可視情況作個別心理治療、團體心理治療、家族治療。
4. 復健治療：包括行為治療、娛樂治療、作業治療、環境治療等，對病人之回歸社會與家庭很重要。

五、 預後

約有 1/4 的病人可完全康復；另外 1/4 的病人反覆發病，退化成嚴重的失智狀態需長期收容照顧；約一半的病人需長期服藥維持在半康復狀態。



～ 如對內容有疑問，請洽詢護理人員或醫師 ～

青海醫院護理科
地址：台中市石岡區金星里下坑巷 41-2 號
電話：(04)2572-1694