

# 蜂窩性組織炎

修訂日期：110 年 4 月

## 一、病因

蜂窩性組織炎是真皮及皮下組織被葡萄球菌或鏈球菌感染之種皮膚疾病。常於下肢有破皮或開放性傷口時，感染部位經淋巴系統散播，可侵犯到結締組織。

## 二、臨床症狀

局部呈現紅、腫、熱、痛，並逐漸化膿和壞死，全身會有發熱，不適和白血球增多等症狀，嚴重可致患肢壞死、敗血症。

## 三、醫療處置

主要為抗生素治療以控制炎症反應，需先做血液培養及敏感試驗，依結果選用正確的全身性抗生素，約一週後症狀會消失。

## 四、護理原則

- 1、患肢必須休息和抬高，以促進靜脈血之回流及減輕水腫。
- 2、密切觀察患部皮膚之紅腫、溫度及疼痛情形之改變。
- 3、患部之傷口護理必須採用外科無菌技術，更換後之敷料則需以有感染標誌之可燃塑膠袋包裝後焚燒。
- 4、患部疼痛可依醫囑給予止痛藥劑。
- 5、鼓勵多臥床休息，攝取高蛋白飲食，增加抵抗力。

～ 如對內容有疑問，請洽詢護理人員或醫師 ～

清海醫院護理科  
地址：台中市石岡區金星里下坑巷 41-2 號  
電話：(04)2572-1694

## 受傷常見錯誤處理態度 後果恐不堪設想



## 傷口消毒處理 醫師建議 4 步驟



小創傷不處理，

小心釀成 **蜂窩性組織炎**

